



CANADIAN VETERINARY
MEDICAL ASSOCIATION

L'ASSOCIATION CANADIENNE
DES MÉDECINS VÉTÉRIAIRES

LISTE DE CONTRÔLE DES VÉTÉRIAIRES POUR L'IMPORTATION D'UN CHIEN

Sujets de discussion avec les clients avant et après l'importation d'un chien au Canada



Avant la décision d'importer :

- Les chiens importés peuvent être porteurs de maladies qui sont rares ou exotiques au Canada.
 - Ces maladies peuvent être transmissibles à d'autres animaux et/ou humains (c.-à-d. des [zoonoses](#)).
 - Certaines maladies sont incurables (p. ex., leishmaniose).
- Les chiens importés peuvent avoir des problèmes de comportement inconnus et impossibles à résoudre.
- Le transport peut être long et stressant et accroître la vulnérabilité aux maladies.
- L'importation de chiens réduit la probabilité d'adoption de chiens locaux.



Avant l'arrivée des chiens au Canada :

- Examen par un vétérinaire autorisé dans le pays d'origine.
- Vaccin contre la rage (exigé par le [gouvernement du Canada](#)).
- Autres [vaccins](#) essentiels.
- [Vermifugation](#), y compris les ténias.
- Traitement contre les parasites externes (p. ex., [puces](#) et [tiques](#)).
- Test pour le [ver du cœur](#).
- Tests pour les maladies qui peuvent être présentes dans le pays d'origine, mais absentes ou rares au Canada (p. ex., Leishmania dans le bassin méditerranéen et en Amérique du Sud ainsi que Brucella canis dans le Midwest américain).



Après l'arrivée des chiens au Canada :

- Quarantaine de 30 jours pour les chiens (minimum de 14 jours) dans une maison ou un établissement à l'écart d'autres animaux et des personnes à risque élevé (p. ex., jeunes enfants, aînés, personnes ayant un système immunitaire affaibli).
- Surveillance étroite pour détecter des signes de maladie et consultation avec un vétérinaire au besoin.
 - Le risque de [rage](#) peut persister pendant jusqu'à six mois.
 - Cultures pour les infections bactériennes soupçonnées en raison du risque d'organismes multirésistants.
- Examen par un vétérinaire le plus tôt possible (même avant de se rendre à la maison).
- Répétition des vaccins ou des tests au besoin.
- Évaluation du comportement.
- Répétition du test du ver du cœur après six mois.
- [Stérilisation](#).
- Identification à l'aide d'une micropuce

