


Déjouez les tiques

Découvrez tout ce qu'il faut savoir à leur sujet



Les tiques sont des arachnides, parents des araignées, des acariens et des scorpions. Elles survivent en piquant les animaux et les humains et en s'alimentant de leur sang.



Les tiques sont de tailles variées. À leur stade immature, les tiques sont à peine visibles. En comparaison, les tiques adultes peuvent être beaucoup plus grosses (relativement parlant, bien sûr!) lorsqu'elles sont gorgées de sang après s'être alimentées sur un animal ou un humain.



On retrouve les tiques dans différentes régions du Canada.

Vous pouvez réduire votre risque d'exposition aux tiques en évitant les habitats de prédilection de celles-ci, notamment les forêts, les sous-bois et les terrains recouverts d'herbes hautes ou de feuilles mortes.



À 4 °C, les tiques sont à la recherche d'un animal ou d'un humain pour se nourrir de sang. Dans la plupart des régions du Canada, les tiques sont actives dès le début du printemps. Elles sont en constante recherche d'hôtes sur lesquels s'alimenter tout au long du printemps, de l'été et jusqu'à la fin de l'automne, lorsque le mercure retourne sous la barre des 4 °C.



Les tiques rampent – elles ne sautent pas, ne volent pas ou ne tombent pas des arbres. Elles sont attirées par les parties du corps qui sont moins visibles. Assurez-vous de vérifier minutieusement et souvent votre animal de compagnie (ainsi que vous-même) après des activités à l'extérieur.



Si vous trouvez une tique, retirez-la... immédiatement! La façon la plus simple et la plus sécuritaire de retirer une tique est de la saisir le plus près possible de la peau avec des petites pinces à pointes fines, en tirant doucement vers le haut, sans écraser le corps. Si vous avez besoin d'aide, communiquez avec votre médecin vétérinaire.



La maladie de Lyme n'est qu'une des nombreuses maladies pouvant être transmises aux animaux de compagnie et aux humains lorsqu'une tique s'alimente de leur sang.

Avant l'exposition

est le meilleur moment pour utiliser un produit de contrôle des tiques. Dans la majorité des régions du Canada, il s'agit du moment où le mercure atteint 4 °C et où les tiques affamées « se réveillent » et sont à la recherche d'un repas de sang.



Votre clinique vétérinaire est l'endroit idéal pour obtenir des renseignements et des conseils pertinents au sujet du comportement des tiques et des dangers qu'elles représentent.

**Renseignez-vous au sujet des mesures de contrôle contre les tiques.
Demandez-nous conseil dès aujourd'hui!**

Une initiative de



CANADIAN VETERINARY
MEDICAL ASSOCIATION
L'ASSOCIATION CANADIENNE
DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

En partenariat avec

